



DONNEZ CORRECTEMENT À UN VEAU UN RÉHYDRATANT ORAL

INTÉRÊT

- Chez le veau en diarrhée
- Répondre aux :
 - pertes en eau
 - pertes en sels minéraux
 - perturbations métaboliques



LE BON GESTE

1 Évaluez le niveau de déshydratation du veau

Tonus	Température	Œil	Tenue du pli de peau	Réflexe de succion
Normal	~38,5°C	Normal	Entre 2 et 4 secondes	Présent ou légèrement atténué
Faible	Anormale (hyper ou hypothermie)	Enfoncé	Au-delà de 5 secondes	Atténué ou absent

utilisation d'un réhydratant oral possible

consultation vétérinaire indispensable

2 Préparez le réhydratant oral*

- Reconstituez le réhydratant avec une eau potable et tiède (autour de 35°C)
- Mélangez bien la poudre à l'eau tiède


3 Donnez le réhydratant

- Donnez de 4 à 6L de réhydratant par jour en fractionnant les repas* : 1 à 2L/buvée, de 3 à 6 fois/jour
- Plusieurs outils d'administration sont possibles :

Seau




Seau avec tétine (flottante ou seau à tétine basse)



Biberon



Sonde œsophagienne (drencher)



Avant de donner le réhydratant, **vérifiez bien le réflexe de succion** en frottant délicatement le palais du veau avec le doigt. S'il déglutit, alors le réflexe est présent.

Si le réhydratant ne comporte pas de lactosérum, **ne coupez pas le lait + de 48 heures** pour préserver sa capacité à être digéré.

* Se référer à la notice du produit pour une utilisation adaptée

Demandez conseil à votre vétérinaire.

Retrouvez
«l'Astuce en +»
sur www.virbac.fr

Façonnons l'avenir de la santé animale

Virbac